

Bcl-6

重组兔单克隆抗体

目录号: HKZ150362

克隆号: BP6216

预测分子量: 79kDa

纯度: ProA affinity purified IgG

种属反应性: Human

形式: Liquid

应用: IHC-P

蛋白质序列数据库ID: P41182

背景:

Bcl-6是一个转录调控基因，编码706氨基酸核蛋白。丝裂原活化的蛋白激酶Erk1和Erk2，而不是JNK，在多个位点磷酸化BCL6。BCL6 Ser333和Ser343位点的磷酸化导致BCL6通过泛素/蛋白酶体途径在B细胞中降解。此外，BCL6被乙酰化，其转录抑制功能受到转录共激活因子p300的抑制。该蛋白的抗体可染色淋巴滤泡生发中心细胞、滤泡淋巴瘤、弥漫性大B细胞淋巴瘤、伯基特淋巴瘤的滤泡细胞和滤泡间细胞，以及结节性淋巴瘤优势型霍奇金病的大多数里德-斯登伯格细胞。

亚细胞定位:

细胞核

推荐方法:

选用Tris-EDTA缓冲液（PH9.0）进行抗原修复；

一抗在室温下（18℃-25℃）孵育30分钟。

免疫原:

人Bcl-6中的重组片段。

存储溶液:

PBS 59%，叠氮化钠0.01%，甘油40%，BSA 0.05%。

储存条件:

-25℃ to -18℃。

存储说明:


以蓝冰运输。收货后，进行分装，并在-25℃至-18℃条件下储存。避免反复冻融。

推荐稀释比:

IHC-P: 1:100-1:200

背景参考文献:

1. Shvarts, A. et al. (2002) Genes Dev 16, 681-6.
2. Bereshchenko, O.R. et al. (2002) Nat Genet 32, 606-13.



用HKZ150362标记Bcl-6的人弥漫性大B细胞淋巴瘤组织（福尔马林固定石蜡包埋切片）免疫组化结果。使用的是用Tris-EDTA缓冲液（PH9.0）进行抗原修复。

仅供科研用途，不可用于临床诊断。